

**RELACION ENTRE EL FITOPLANCTON Y LA SALINIDAD, DE LAS
LAGUNAS INTRADUNARES DE LA DEHESA DE LA ALBUFERA
(VALENCIA)**

Soria, J.M. y M. Ros.
E-mail: juan.soria@uv.es

Departamento de Microbiología y Ecología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universitat de Valencia. 46100-Burjassot (Valencia). Spain.

Publicado originalmente en:

Soria, J.M. y M. Ros. 1991. Relación entre el fitoplancton y la salinidad, de las lagunas intradunares de la Dehesa de la Albufera (Valencia). Act. Bot. Malac. 16(1): 43 - 50.

RESUMEN

Las áreas deprimidas entre los cordones dunares de la Dehesa de la Albufera se conocen con el nombre popular de "malladas". Algunas de ellas se inundan formando pequeñas lagunas de profundidad escasa (entre 0.5 y 1.9 m) y de conductividad variable. Mientras las más profundas son permanentes, las someras son temporales, permaneciendo inundadas sólo las estaciones húmedas. El fitoplancton de estas lagunas se distribuye relacionado principalmente con esta salinidad variable y también influido por la inundación provocada con aguas provenientes de la Albufera, que ocasiona la aparición de especies propias del lago hasta que son sustituidas por las propias que corresponde.

ABSTRACT

**PHYTOPLANKTON FROM SMALL INTRADUNE
LAGOONS OF VALENCIA (SPAIN)**

The flooded areas between the dunes in the "Dehesa de La Albufera" are known as "mallades". They are lagoons of limited depth (between 0.5 and 1.9 m) and variable conductivity. While the deepest lagoons are permanent, the shallowest are temporary. Phytoplankton is widely distributed and related with salinity and chloride concentration, except when a temporary lagoon, named Rincón 3, is inundated with Albufera's water. Then, all phytoplankton that appears is the same of Albufera, and is replaced some weeks after.

INTRODUCCION

La Dehesa es una barra arenosa que se extiende paralela a la costa y separa el Mar Mediterráneo de la Albufera de Valencia. Tiene unos 14 km de longitud y una anchura variable, entre 500 y 1000 m. Fue formada porque un golfo marino creado por un hundimiento, se fue rellenando por aluviones cuaternarios con un fondo de gravas y limos. La aportación de materiales fluviales es fundamental en el proceso de relleno de la zona deprimida, formándose una restinga litoral. En la conformación final ha desempeñado un papel importante la corriente longitudinal marina de deriva, que es oblicua a la costa y terminó por cerrar los golfos primitivos (Ruiz, 1973).

La morfología primitiva ha sido muy alterada, y en la Dehesa se puede comprobar la presencia de grandes conjuntos dunares. El conjunto exterior, formado por grandes dunas con vegetación, que alcanzaban una altura entre 4 y 9 m. El conjunto interior es de menor altura (unos 3 m), pero de mayor anchura. Entre ellos se extiende longitudinalmente una amplia zona deprimida de anchura variable y de difícil drenaje por donde circulaba el camino central de la Dehesa (Ayto. Valencia, 1980). Esta zona se conoce con el nombre de "Mallada", y designa por extensión a las lagunas intradunares temporales o permanentes, rodeadas de vegetación acuática, que la inundan y que se forman por la proximidad del nivel freático y las lluvias.

Las Malladas de la Dehesa conocidas como Garrofera, Larga y la Mata, tienen una forma aproximadamente longitudinal, por encontrarse limitadas por las dos dunas de la Dehesa, en dirección N-S. Mantienen el nivel del agua todo el año. Las Malladas denominadas Rincón 1, Rincón 2 y Rincón 3 se encuentran dentro del área de protección del "Racó de L'Olla", antiguo hipódromo. La figura 1 nos muestra la situación de estas lagunas con respecto a la Albufera y el Mar Mediterráneo. Se caracterizan por ser temporales, perdiendo el agua durante la estación seca. Rincón 3 se encuentra comunicada con las aguas de la Albufera por un canal, que permite la entrada o posible salida de las aguas desde o hacia la Albufera.




Figura 1. Ubicación de las muestreos estudiados en la Devesa:
1, Garrofera; 2, Larga; 3, Mata; 4, Rincón 1; 5, Rincón 2; 6, Rincón 3.

MÉTODOS

Las tomas de muestras se realizaron desde febrero de 1987 hasta enero de 1988, intentando que la frecuencia fuera de seis semanas aproximadamente.

Se tomaron muestras de agua a 0.2 - 0.5 m de profundidad con botellas de 1 l de capacidad. De esta muestra se separaron diferentes fracciones, conservadas según la metodología descrita por Stainton *et al* (1977). Se conservó 1 l aproximadamente de muestra fijada con lugol para la observación y recuento de fitoplancton, que se efectuaba dejando sedimentar en cubetas cilíndricas volúmenes de agua de 1 a 3 ml durante 24 horas al menos (Utermöhl, 1958). Posteriormente se observaba a 1000 aumentos en microscopio invertido. La identificación de las especies dudosas se ha realizado en un microscopio normal a 2000 aumentos, tanto en campo claro como en contraste de fases. Para la clasificación de las algas se ha seguido a Desikachary (1959) para el grupo de las Cianobacterias; a Germain (1981) para las Diatomeas, y a Huber-Pestalozzi (1938, 1955, 1961, 1968, 1971, 1978) para los demás grupos fitoplanctónicos.

Se calculó el índice de diversidad según Shannon-Wiever (Legendre, 1979), que nos da una medida de la organización del sistema. Se emplearon para el proceso estadístico los programas BMDP 1D, que nos muestra la variabilidad de los parámetros fisicoquímicos y su distribución en las Lagunas, y 4M que realiza un análisis multivariante de las variables normalizadas. Para ello se consideraron los valores de la transformación logarítmica de las variables originales. Se obtuvo la matriz de correlaciones entre variables y una agrupación "Cluster" de ellas (Sneath y Sokal, 1973).

RESULTADOS

MINERALIZACION DE LAS AGUAS

Las aguas de las lagunas tienen escaso contenido en nitrógeno y fósforo (Tabla I), y no parecen presentar problemas de contaminación por vertidos. La alcalinidad es elevada y los valores del cloruro y sulfato son variables según la salinidad propia de cada charca. La concentración de sulfato es baja en general, entre 0.1 y 2.5 g/l, mientras que la del cloruro presenta los valores más variables. Se califican las aguas salobres en aguas oligohalinas cuando tienen hasta 2 g/l de cloruro, mesohalinas de 2 a 10 g/l, polihalinas de 10 a 17 g/l, y aguas hiperhalinas cuando éstas se evaporan, y aumenta más la concentración de sales (Margalef, 1983).

Tabla 1. Valores medios (media) y desviación estándar (std) de las variables consideradas en el estudio de las lagunas intradunares de la Devesa de El Saler (Valencia).

	Garrofera		Larga		Mata		Rincón 1		Rincón 2		Rincón 3	
	media	std	media	std	media	std	media	std	media	std	media	std
Temperatura (°C)	21	07	19	06	18	06	14	04	15	03	21	08
Conductividad(mS/cm)	2.10	0.32	24.71	9.25	1.61	0.51	2.91	0.79	18.41	11.44	36.57	25.40
Oxígeno (mg/l)	7.49	2.80	5.31	2.78	4.66	2.38	4.95	2.66	12.90	5.16	11.77	5.44
pH	7.92	0.55	7.82	0.57	7.69	0.72	7.75	0.23	8.37	0.49	8.64	0.92
Alcalinidad (meq/l)	4.64	1.19	7.58	1.61	6.96	1.83	4.97	1.08	6.61	4.78	5.02	3.01
Cloruro (meq/l)	17.82	5.64	395.73	201.36	13.89	5.04	59.53	61.04	256.98	146.78	608.17	500.54
Sulfato (meq/l)	4.07	0.26	10.15	4.98	2.79	4.25	3.05	1.39	16.50	8.88	30.84	23.41
Nitrato (µM)	1.56	2.74	1.74	1.64	2.97	6.50	0.92	0.83	1.01	0.98	1.07	1.06
Nitrito (µM)	0.32	0.52	0.39	0.58	0.18	0.25	0.22	0.13	0.14	0.12	0.07	0.07
Amonio (µM)	31.58	41.09	53.96	77.27	3.07	3.47	6.06	5.89	1.22	1.86	1.00	1.35
Fosfato (µM)	0.44	0.74	0.16	0.18	0.11	0.08	4.93	2.74	0.21	0.17	0.33	0.26
Silicato (µM)	53.07	50.34	204.25	109.89	270.88	144.06	88.54	48.30	101.63	77.83	128.72	79.85
Clorofila A (mg/m3)	27.71	34.78	29.25	10.91	27.69	10.74	9.90	11.36	36.06	13.93	57.66	24.36
Fitoplancton(ind/ml)	86781	60941	28944	45673	40408	47317	2238	1915	50833	50617	27578	15681

Estas lagunas, pese a su proximidad no son homogéneas, y son una muestra de la importancia que tiene conocer la distribución de las masas del acuífero de la Dehesa: la primera, Rincón 1, es oligohalina, Rincón 2 es mesohalina con tendencia polihalina (entre 3 y 14 g/l de cloruro) y Rincón 3 es polihalina llegando a hiperhalina cuando las aguas están en niveles bajos. Esta última laguna es el centro de la futura reserva biológica del "Racó de L'Olla", y se ha construido un canal que la enlaza con la Albufera, con la intención de inundarla en momentos de bajo nivel freático, o desaguarla en momentos de nivel elevado. Así, durante las lluvias del invierno de 1986-87, el acuífero de la Dehesa se recargó de tal manera que en lugar de entrar agua desde el lago, salía hacia él. El agua que fluía desde la depresión era salobre, con un contenido de 12 g/l de sales disueltas. Cuando bajó el nivel, aumentó la concentración hasta 60 g/l depositándose las evaporitas. Posteriormente, en agosto de 1987 se inundó con aguas de La Albufera (salinidad en torno a 1 g/l) que disolvieron los precipitados y salinizaron el

agua, muy concentrada al principio, y menos después de las tormentas de otoño de 1987, cuando bajó hasta 5 g/l por dilución con aguas de lluvia (Soria *et al*, 1988)

FITOPLANCTON

La distribución de las especies del fitoplancton encontradas en la lagunas de la Dehesa es particular para cada una de ellas. El promedio de especies oscila entre 28 especies en la Laguna de la Garrofera y 12 especies en Rincón 1 (figura 2). Las familias con mayor número de especies son Bacillariophyceae y Chlorophyta, seguido de Cyanophyceae.






Figura 2. Valor medio del número de especies presentes en cada laguna intradunares de la Dehesa del Saler.

Los valores medios para cada laguna del número de individuos por mililitro de muestra son variables. Estos valores están comprendidos entre 86000 ind/ml de media en la laguna de la Garrofera y 2300 ind/ml en Rincón 1. Por familias, las más abundantes son las Chlorophyta en las lagunas permanentes, mientras que las Bacillariophyceae y las Cyanophyceae son las más abundantes en las lagunas temporales.


En la Garrofera, dominan inicialmente las Chlorophyta, mientras que a finales del verano y otoño aparecen las Cyanophyceae, que vuelven a desaparecer en el invierno, aumentando de nuevo las primeras.




En la Larga aparece baja cantidad de individuos excepto en el otoño, tras la inundación de toda el área. Es un dominio de las Chlorophyta, especialmente de la especie *Nephroselmis salina* que no aparece más que en estos momentos.




En la laguna de la Mata son las Chlorophyta las dominantes en cualquier momento. Los máximos de población total se presentan en primavera y verano, y los mínimos en los momentos de mayor inundación.




Las lagunas del "Racó de L'Olla" presentan grandes fluctuaciones debidas sobre todo a sus características y a su temporalidad. Rincón 1 presenta una variabilidad entre las Chlorophyta en abril y flagelados de la familia Haptophyceae en enero. Se caracteriza sobre todo por la escasa densidad de población de individuos en cualquier momento.



Rincón 2 presenta un crecimiento de *Chaetoceros muelleri* en enero, tras la inundación de otoño, y poblaciones importantes de Cyanophyceae provenientes de las aguas de la Albufera que llegan desde la laguna vecina Rincón 3.



La laguna Rincón 3 se caracteriza por tener su flora autóctona durante la primavera, formada inicialmente por *Rhodomonas lacustris*, sustituida luego por las Chlorophyta, Bacillariophyceae y Flagelados, y por último, en los momentos de mayor salinidad, la mayoría es de *Nitzschia closterium*. Antes de las lluvias se inundó con agua de la Albufera, y aparece una población en otoño e invierno formada por especies de Cyanophyceae propias de allí, como *Oscillatoria aghardii*, *Oscillatoria redekei* y en enero también aparece *Chaetoceros muelleri*, como en Rincón 2, ya comentado anteriormente.



Los valores bajos del índice de diversidad de Shannon indican inestabilidad en el sistema, mientras que las diversidades altas mayor organización. Presentan mayor diversidad en conjunto las lagunas permanentes que las temporales. Dentro de ellas, las de agua oligohalina aún tienen mayor diversidad que las polihalinas. Los valores máximos son de 3.9, siendo el valor medio de 2.6. Las lagunas más salobres tienen una diversidad media de 2.

CORRELACIONES

Un análisis de correlación multivariante de las especies fitoplanctónicas y los parámetros fisicoquímicos pone de manifiesto la relación entre ellos y las diferentes especies. Los grupos de correlación nos indican cómo las especies se distribuyen en función de la temperatura, salinidad y fosfatos. Para el conjunto de las lagunas, se han establecido los siguientes grupos de correlación:

Un primer grupo nos agrupa aquellas especies presentes en las lagunas de mayor salinidad, tanto en la laguna Larga como en Rincón 3, y son *Amphora lineolata*, *Synedra tabulata*, *Amphora coffeiformis*, *Oxyrhis marina* y *Nitzschia closterium*. Presentes sólo en la laguna Larga está *Nephroselmis salina* y *Gymnodinium splendens*. Exclusivamente en esta laguna, y en verano, se encuentran agrupadas las especies *Chroococcus tenax*, *Gomphosphaeria aponina*, *Diploneis smithii*, *Plagiotropis lepidoptera*, *Amphora communata*, *Mastogloia lanceolata*, *Navicula pupula* var. *capitata* y *Nitzschia hungarica*; es el momento en que alcanza los valores máximos en amonio y alcalinidad de las aguas, que aparecen muy correlacionados con estas especies. Por último, las especies *Chaetoceros muelleri*, *Nitzschia closterium* y otras indeterminadas del género *Gymnodinium* se presentan en los periodos de temperaturas bajas, otoño e invierno.

Un segundo grupo está formado por las especies presentes en las lagunas de aguas de conductividad más baja. Encontramos agrupadas las especies presentes sólo en la laguna de la Garrofera, como *Merismopedia punctata*, *Tetraedron minimum*, *Navicula lanceolata*, *Crucigeniella tetrapedia*, *Nitzschia amphibia* y *Monoraphidium tortile*. Asociadas a ellas están las especies presentes tanto en esta laguna como en la Mata. Son *Cryptomonas erosa*, *Kirchneriella irregularis*, *Monoraphidium controtum*, *Didimocystis bicellularis*, *Synedra ulna*, *Kirchneriella lunaris* y *Monoraphidium kormakovae*.

El tercer grupo agrupa a las especies encontradas en las lagunas del Rincón 2 y Rincón 3, salobres, pero que se encuentran allí arrastradas por el flujo de agua procedente de La Albufera. Son *Scenedesmus acuminatus*, *Oscillatoria aghardii*, *Lyngbya limnetica*, *Anabaenopsis circularis*, *Oscillatoria redekeii*, *Lyngbya contorta*, *Lyngbya bipunctata*, *Monoraphidium pusillum*, *Nitzschia palea* var. *tenuirostris* y *Nitzschia palea*. Estas especies se encuentran normalmente allí (Soria *et al*, 1987) y aquí aparecen tras la inundación, y van siendo sustituidas por especies más propias de las aguas salobres.

CONCLUSIONES

Dos son los factores naturales que afectan a la distribución del fitoplancton en las lagunas intradunares de la Dehesa: por una parte la concentración de cloruro, y por otra

la temporalidad de sus aguas. Un tercer factor es la manipulación humana inundándolas con aguas procedentes de otro ecosistema, que produce la aparición de especies alóctonas (en su mayoría Cianofíceas), que son sustituidas por las especies propias que corresponden a su calidad de aguas.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Unidad Docente de Ecología del Departamento de Microbiología de la Fac. de Biológicas de la Universitat de València su ayuda prestada en medios materiales; y a la Oficina Técnica Devesa-Albufera del Excmo. Ayto. de Valencia su apoyo económico en la realización del presente estudio.

BIBLIOGRAFIA

- APHA, AWWA, WPCF. 1985. **Standard Methods for the examination of water and wastewater**. American Public Health Association. 1268 págs.
- Ayuntamiento de Valencia. 1980. **Estudios previos para la ordenación del monte de la Dehesa del Saler**. Publ. Arch. Munic. Valencia. 95 págs.
- Desikachary, T.V., 1959. **Cyanophyta**. Indian Council of Agricultural Research. Nueva Delhi.
- Germain. H. 1981. **Flore des Diatomées**. Eds. Boubée. Paris. 441 págs.
- Huber-Pestalozzi, G. 1938. **Das phytoplankton des Süßwassers. Allgemeiner Teil. Blaualgen. Bakterien. Pilze**. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (Erwin Nägele). Stuttgart. Band XVI. Teil. 1: 342 pp.
- Huber-Pestalozzi, G. 1941. **Das phytoplankton des Süßwassers. Chrysophyceen. Farblose flagellaten. Heterokonten**. (Idem). Teil. 2: 365 pp.
- Huber-Pestalozzi, G. 1942. **Das phytoplankton des Süßwassers. Diatomeen**. (Idem). Teil. 3: 549 pp.
- Huber-Pestalozzi, G. 1955. **Das phytoplankton des Süßwassers. Euglenophyceae**. (Idem). Teil. 4: 606 pp.
- Huber-Pestalozzi, G. 1961. **Das phytoplankton des Süßwassers. Chlorophyceae. Volvocales**. (Idem). Teil. 5: 744 pp.
- Huber-Pestalozzi, G. 1968. **Das phytoplankton des Süßwassers. Cryptophyceae. Choloromonadophyceae. Dinophyceae**. (Idem). Teil. 6: 322 pp.
- Huber-Pestalozzi, G. 1972. **Das phytoplankton des Süßwassers. Chlorophyceae. Tetrasporales**. (Idem). Teil. 7: 116 pp.
- Legendre, L. y P. Legendre. 1979. **Ecologie numérique. Tome 2: La structure des données écologiques**. Masson. Paris. 254 págs.
- Margalef, R. 1983. **Limnología**. Omega. Barcelona. 1010 págs.

- Ruiz, P. 1973. Monte de la Devesa. **Gran Enciclopedia de la Región Valenciana**, 4: 32.
- Sneath P.H.A. y R.R. Sokal. 1973. **Numerical Taxonomy**. W.H. Foreman. San Francisco.
- Soria, J.M., W. Colom y L. Ballesteros. 1988. Estudio comparado de la salinidad en "Les mallades de la Devesa", Valencia. **Congreso Europeo de Ordenación del Territorio**. Actas 1: 53-55.
- Soria, J.M., M. Miracle y E. Vicente. 1987. La Albufera de Valencia: Comunidades fitoplanctónicas en la campaña 1982-83. **VI Simp. Nac. Bot. Cript.** Actas: 165 - 172.
- Stainton, M.P., M.J. Capel and F.A.J. Armstrong. 1977. **The Chemical analysis of fresh water**. Can. Fish. Mar. Serv. Misc. Spec. Publ. 25:180 p.
- Utermöhl, H., 1958. Zur Vervollkommung der quantitative Phytoplankton Methodik. **Mitt. Int. Verein. Limnol.**, 9:1-38.

ANEJO

Lista de especies encontradas en las distintas muestras de las Malladas estudiadas, indicando el número de muestras en las que se ha encontrado y el total de individuos.

ESPECIE	N. MUEST	TOTAL
Chroococcus tenax	2	232
M. punctata	5	138980
M. marsonii	2	21444
M. tenuissima	3	467
M. sp.	4	950
Gomphosphaeria aponina	3	82
Oscillatoria aghardii	5	48705
O. redekei	5	46029
O. sp. pl.	23	14467
Lyngbya bipunctata	4	1383
L. contorta	5	4090
L. limnetica	5	2755
Anabaena sp. pl.	4	429
Anabaenopsis circularis	5	12296
Cryptomonas erosa	15	24380
C. cf. caudata	3	3016
C. phaseolus	8	27537
C. sp. pl.	2	563
Rhodomonas lacustris	9	24468
R. sp.	7	5782
Desmarella moniliformis	3	294
Kephyrion sp.	7	1365
Pseudopedinella pyriforme	13	12811
Ochromonas sp.	3	276
Mallomonas sp. pl.	8	1403
Pyramidomonas sp. pl.	7	11640
Nephroselmis salina	3	57211
Tetraselmis sp.	2	1724

Relacion entre el fitoplancton y la salinidad, de las lagunas intradunares de la Dehesa de la Albufera (Valencia)

Spermatozopsis exultans	3	434
Chlamydomonas sp. pl.	13	19824
C. sp. pl.	6	5145
Tetraedron minimum	8	30564
Formas de chlorococcales	14	389661
Lagerheimia genevensis	2	314
Kirchneriella contorta	17	29115
K. irregularis	14	63143
K. lunaris	8	4540
K. obesa	3	545
Monoraphidium contortum	19	57354
M. komarkovae	12	12097
M. pusillum	2	994
M. tortile	6	86267
Dictyosphaerium pulchellum	3	13296
Crucigeniella tetrapedia	8	67592
Didimocystis bicellularis	18	64801
Scenedesmus acuminatus	5	2244
S. armatus	2	319
S. lefevrii v. manguimii	3	4592
S. sp. pl.	17	22498
Keratococcus bicaudatus	2	354
Cyclotella meneghiniana	28	7009
Chaetoceros muelleri	6	121229
Diatoma cf. vulgare	2	107
Fragilaria sp.	3	211
Synedra tabulata	7	427
S. ulna	14	2265
S. sp. pl.	3	379
Achnanthes sp. pl.	12	3510
Cocconeis placentula	17	1602
Mastogloia braunii	4	382
M. lanceolata	3	81
M. smithii v. amphicephala	4	134
Pleurosigma sp.	4	122
Plagiotropis lepidoptera	3	43
Amphiprora alata	2	80
Diploneis smithii	5	286
Pinnularia sp.	2	76
Navicula cryptocephala	6	1097
N. gracilis	2	264
N. halophila	4	376
N. pupula v. capitata	6	424
N. pygmaea	2	99
N. viridula v. rostellata	2	199
N. sp. pl.	20	3551
Cymbella sp.	2	246
Amphora coffeoeformis	12	2789
A. lineolata	2	1494
A. communata	3	37
A. ovalis	4	207
A. sp. pl.	7	710
Gomphonema angustatum	2	245
G. acuminatum v. brebissonii	3	77
Gomphoneis sp.	3	346
Epithemia zebra	4	539
Nitzschia amphibia	4	996
N. closterium	8	22772
N. dissipata	2	209
N. hungarica	12	651

Relacion entre el fitoplancton y la salinidad, de las lagunas intradunares de la Dehesa de la Albufera (Valencia)

N. longissima	4	736
N. palea	13	8504
N. palea v. tenuirostris	3	698
N. sigmoidea	2	86
N. sp. pl.	11	1596
Otras pennadas	25	10118
Amphidinium sp.	3	97
Gymnodinium sp. pl.	15	5418
G. splendens	2	24
Oxyrhis marina	7	6006
Peridinium incospicuum	7	5035
P. sp. pl.	12	672
Euglena sp. pl.	12	3183
Phacus sp. pl.	14	15921
Trachellomonas sp. pl.	5	2633
Cosmarium sp.	8	534
Prymnesium parvum	3	741
Flagelados pequeños	19	16752
Ciliados	15	1555
Otros Protozoos	9	1129
Número de especies		162